Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuksköterska innehåller information om Dacepton®(apomorfin, 5 mg/ml infusionsvätska i lösning) för användning i SO❤CONNECT pump.

Användarinstruktion

Injektionsflaska
Dacepton® 5 mg/ml
à 20 ml infusionsvätska





SO❤CONNECT pump



20 ml ampull



Infusionsset



Minispike

Dacepton®
Apomorfin


Så här gör du iordning en 20 ml infusion med Dacepton® 5 mg/ml

1. Förbered din pump för fyllning av läkemedel enligt instruktion från tillverkaren.

2. Öppna en flaska Dacepton® genom att ta bort (flippa av) plastlocket. Undvik att röra det sterila gummimembranet.



3. Ta bort det gröna spetsskyddet och tryck minispiken genom gummiproppen.






4. Öppna det gröna locket på minispiken. Skruva fast ampullen på minispiken.







5. Vänd flaska, minispike och ampull upp och ner. Dra ner läkemedlet i ampullen.




6. Vrid loss ampullen från minispiken och skruva fast slangen på ampullen.





7. Skruva motsols bort kolvstången från den fyllda ampullen och skruva loss stödet (vrid ett kvarts varv motsols)





8. Tryck fast ampullen på pumpen.



Se till att det svarta gummimembranet ligger tätt mot pumpens kolvstång. Vrid ampullen medsols så ampullen klickar fast.

9. Starta infusionen enligt instruktionen för din SO♥CONNECT pump. Nu är pumpen redo att användas. Säkerställ att pump och kanyl är kopplade till kroppen.

PD.SE.030-03-JUN2022

Support

Vardagar kl 8-17
Tel: 020-22 55 20
parkinsonsupport@adxto.com

Dacepton 5 mg/ml infusionsvätska, lösning innehåller apomorfinhydrokloridhemihydrat s om tillhör e n g rupp l äkemedel s om kallas dopaminagonister. Dacepton är ett läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom. Apomorfin m inskar t iden m ed ”off” eller orörliga perioder hos personer som tidigare behandlats för Parkinsons sjukdom med levodopa och/eller andra dopaminagonister. Dacepton injiceras under huden, såsom läkaren eller sjuksköterskan visat dig. **Använd inte Dacepton** om du är allergisk mot apomorfin e ller något annat innehållsämne, om du är under 18 år, om du har andningssvårigheter eller astma, om du har demens eller Alzheimers sjukdom, om du har förvirring, hallucinationer eller några andra liknande problem, om du har någon leversjukdom, om du har svår dyskinesi (ofrivilliga rörelser) eller svår dystoni (oförmåga att röra sig) pga. behandlingen med levodopa, om du eller någon i din familj har ett avvikande EKG (s.k. långt QT-syndrom) eller om du använder ondansetron. **Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska** innan du använder Dacepton om du har njurproblem, lungsjukdom eller hjärtsjukdom, om du har lågt blodtryck eller känner dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp, om du tar andra läkemedel, om du är illamående eller kräks eller är äldre eller svag. Tala om för läkaren om du utvecklar en stark lust att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen att utföra aktiviteter som kan skada dig eller andra (t.ex. spelberoende, tvångsmässigt ätande eller köpande, onormalt hög sexualdrift eller ökning av sexuella tankar och känslor). Vissa patienter kan få beroendeliknande symtom. Kör inte och använd inte verktyg eller maskiner om Dacepton gör dig sömnig. Ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Tala med läkaren om du ammar eller planerar att amma. Innehåller natriummetabisulfit s om i s ällsynta f all k an o rsaka a llvarliga allergiska reaktioner och bronkospasm. Innehåller 3,4 mg natrium per ml vilket bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.
För fullständig information om Dacepton, läs noga bipacksedeln (se även www.fass.se).
Datum för översyn av produktresumén: 2021-05-28. NordicInfu Care AB www.infucare.se.

Distr: NordicInfu Care AB
Alvik, Sverige
Tel: +46 8-601 24 40
www.infucare.se